

● مقاله تحقیقی

تأثیر یک دوره تمرین با شدت متوسط بر سطوح LRP1 پلاسمایی و آمیلوئید بتای مغزی و پلاسمایی در رت‌های آلزایمری القا شده

مصطفی زرین‌افضل^۱، یاسر کاظم‌زاده^{۲*}، سعید صداقتی^۳،
ساناز میرزا‌ییان^۴، عبدالعلی بنایی‌فر^۴

چکیده

مقدمه: رسوب آمیلوئید بتا (A β) در مغز موجب شروع بیماری آلزایمر می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی با شدت متوسط بر سطوح انتقال‌دهنده‌های A β پلاسمایی (LRP1) و سطوح آمیلوئید بتای مغزی و پلاسمایی در رت‌های آلزایمری القا شده بود.

روش بورسی: بدین منظور ۳۰ سر رت نژاد ویستار هشت هفته‌ای با میانگین وزنی ۱۹۱ ± 10 گرم به روش تصادفی ساده به سه گروه مساوی شامل A β +ورزش، A β و کنترل تقسیم شدند. رت‌های گروه‌های اول و دوم از طریق تزریق A β 1-42 به فضای درون بطنی آلزایمری شدند. گروه A β +تمرين پس از ۳ روز ریکاوری، تمرین هوایی تناوبی با شدت متوسط به مدت ۴ هفته را تجربه نمودند. بقیه گروه‌ها به زندگی عادی خود ادامه دادند.

یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین میانگین سطوح A β هیپوکمپ، A β پلاسما و LRP1 پلاسمایی در گروه‌های مختلف تحقیق تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($p=0.001$). همچنین نتایج آزمون تعقیبی LSD بیانگر بیشترین اختلاف میانگین گروه A β +ورزش با گروه A β در متغیرهای فوق بود.

بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط می‌تواند با افزایش سطوح LRP1 پلاسمایی و پاکسازی محیطی سطوح A β در هیپوکمپ، منجر به تعدیل و کنترل عوامل مؤثر در بیماری آلزایمر در رت‌های آزمایشگاهی شود.

کلمات کلیدی: تمرین هوایی، بیماری آلزایمر، آمیلوئید بتا، LRP1

(سال بیست و دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹، مسلسل ۷۳)

تاریخ پذیرش: ۱۰/۱۰/۹۹

فصلنامه علمی پژوهشی ابن سينا / اداره بهداشت، امداد و درمان نهاد

تاریخ دریافت: ۹/۹/۹۹

۱. دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد

اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

۲. استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

(مؤلف مسئول)

yaser.kazemzadeh@yahoo.com

۳. دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،

اسلامشهر، ایران

۴. دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

تهران، ایران

مقدمه

که به طور زیادی در مغز بیان می‌شود و در سیناپس‌های عصبی تمرکز می‌یابد. این پروتئین در حفاظت عصبی و به عنوان یک تنظیم‌کننده رشد سلول عصبی، تعاملات سلول-سلول یا سلول-ماتریکس و در شکل پذیری سیناپسی^۳ نقش دارد. رسوب رسوب آميلوئید بتا (A β) در مغز به عنوان پلاک‌های پیری و آنژیوپاتی آميلوئیدی مغزی^۴ آبشاری از رویدادها را آغاز می‌کند که موجب شروع بیماری آلزایمر می‌شود. تجمع داخل سلولی A β می‌تواند از یک سلول به سلول دیگر متصل به آن منتقل شود که منجر به پیشرفت تدریجی بیماری زایی در بیماری آلزایمر می‌شود [۶]. انباستگی سلولی تجمعات پروتئینی مختلف و کاهش کارایی تخریب لیزوژومی و پروتئوزومی با پیشرفت بیماری در ارتباط است؛ چرا که نقص آنها می‌تواند منجر به انباسته شدن داخل سلولی تجمعات A β شود [۷]. به علاوه، نقص آنزیم‌های تخریب کننده A β و فرایнд پاکسازی غیرطبیعی لیپوپروتئین‌ها نقشی حیاتی در علت‌شناسی این بیماری ایفا می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش تخریب و/یا پاکسازی A β در سمیت انباستگی و آثار سمیت سلولی^۵ در گیرار می‌شود. تغییر متابولیسم پپتید A β نقش مهمی در آبشار ارتباط نزدیک بین A β و بیماری آلزایمر، کاهش سطوح A β یک شیوه درمانی مؤثر برای این بیماری به شمار می‌رود [۸] [۹].

از سوی دیگر، قویاً برای پیشگیری از بیماری‌های عصبی و به تعویق اندختن فرآیندهای پیری، به انجام ورزش توصیه شده است. یافته‌های مطالعات حاکی از آن است که فعالیت جسمانی به عنوان روشی بی‌خطر، کم‌هزینه و مؤثر در پیشگیری و بهبود علائم بیماری آلزایمر مطرح است. فعالیت ورزشی منظم نقش حفاظت نورونی دارد، نوروتروفین‌ها را به صورت مثبت تنظیم می‌کند و بر ادراک، حجم مغز و فعالیت شبکه عصبی در

برآوردهای کنونی حاکی از آن است که حدود ۳۳/۹ میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. با رشد نامتناسب جمعیت مسن، آلزایمر که رایج‌ترین شکل زوال عقل در میان افراد مسن است، آماده تبدیل شدن به یک بحران سلامتی عمومی است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ شیوع بیماری آلزایمر به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر برسد [۱]. پیری مهمترین عامل خطر برای بیماری آلزایمر است که با اختلال تدریجی در دستگاه‌های تخربی در ارتباط است [۲]. حتی کاهش نسبتاً کم در بروز این بیماری می‌تواند تأثیر قابل توجهی در هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. گزارش شده است که تأخیر ۵ ساله در شروع زوال عقل موجب کاهش ۵۰ درصدی در تعداد موارد زوال عقل خواهد شد [۳]. با این‌که تحقیقات بی‌شماری در این زمینه صورت گرفته است و داروهای متعددی نیز برای مقابله با این بحران پیش رو ارائه شده است، درمان‌های فعلی به دلیل کارایی محدود، عوارض جانبی قابل توجه و به طور کلی عدم تغییر چشمگیر در مسیر بیماری آلزایمر ناکام مانده‌اند [۴]. در حالی که مطالعات بیشتری برای شناسایی درمان‌های دارویی مؤثر نیاز است، شیوع فزاینده بیماری آلزایمر و افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، روش‌های در دسترس و کارآمد برای مقابله با این بیماری را می‌طلبد. همراه با نبود درمان متداولی که بتواند این بیماری را متوقف کند، انگیزه بزرگی به سمت تلاش‌های مربوط به تشخیص اولیه و پیشگیری از بیماری آلزایمر وجود دارد. عادات شیوه زندگی که به طور بالقوه می‌تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده یا آن را کند نماید، به طور ویژه‌ای مهم است؛ چرا که انحطاط عصبی در این بیماری تا یک دهه یا بیشتر قبل از ظهور علائم بالینی شروع می‌شود [۵]. پروتئین پیش ساز آميلوئید^۶ یک پروتئین ترا غشایی^۷ است

3. Synaptic plasticity

4. Cerebral amyloid angiopathy (CAA)

5. Cytotoxic

1. Amyloid precursor protein (APP)

2. Transmembrane protein

گروه کنترل تقسیم شدند. رت‌های گروههای اول و دوم از طریق تزریق $A\beta$ 1-42 به فضای درون بطنی آزاریمی شدند. به منظور آماده‌سازی پیتید $A\beta$ 1-42، ابتدا $A\beta$ 1-42 را در محلول سالین حل می‌کنیم تا pH محلول به $\frac{7}{4}$ برسد. سپس، محلول حاصل سه روز قبل از استفاده در دمای 37°C درجه سانتی‌گراد انکوبه شد تا $A\beta$ 1-42 به صورت متراکم^۲ درآید [۱۵]. برای القا آزاریم، در ابتدا، رت‌ها پس از استراحت شبانه با تزریق درون صفاقی کتابخانه (75mg/Kg) و زایلازین ($2/5\text{mg/Kg}$) بی‌هوش شدند. سپس، برای انجام جراحی استرنووتاکسی^۳ از دستگاه استرنووتاکس استفاده شد. بدین منظور، سر حیوان در دستگاه استرنووتاکس ثابت شد و با ایجاد شکاف طولی در بخش خلفی جمجمه، کانول‌های مخصوص تزریق در داخل بطن‌های جانبی در موقعیت $0/8$ عقب برگما، $1/5$ میلی‌متر در طرفین شکاف طولی، و $2/5$ میلی‌متر پایین‌تر از سطح جمجمه قرار می‌گیرند. تزریق درون بطنی شکل متراکم $A\beta$ 1-42 (هر طرف پنج میکرولیتر) با استفاده از میکروسرنگ همیلتون صورت گرفت. برای اطمینان از محل درست تزریق، در مغز دو تا از رت‌ها رنگ تزریق شد و پس از کشتار، محل تزریق بررسی شد.

گروه $A\beta$ +تمرين پس از سه روز ریکاوری، تمرين هوایی تناوبی با شدت متوسط به مدت چهار هفته را تجربه نمودند. بقیه گروه‌ها به زندگی عادی خود ادامه دادند. همچنین، گروههای بدون تمرين هم‌زمان با گروه تمرينی و با مدت مشابه با آنها در معرض نوارگردان خاموش قرار گرفتند تا شرایط محیطی برای همه رت‌ها یکسان باشد.

جهت انجام پروتکل تمرين، رت‌ها بر روی نوارگردان با شبی صفر درجه از ساعت ۹ صبح تا $2/30$ بعد از ظهر و از شنبه تا چهارشنبه به مدت ۴ هفته (۵ روز در هفته با شدت و مدت مورد نظر) به تمرين پرداختند. رت‌ها در هفته اول و دوم با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه در دو سمت جداگانه ۱۵ دقیقه‌ای با

مطالعات کنترل شده بر روی افراد مسن که از لحاظ ادراکی سالم هستند و بزرگسالان با اختلال حافظه، آثار مطلوبی دارد [۱۰]. همچنین، افزایش فعالیت جسمانی به‌طور بالقوه از طریق آثار آن بر نشانگر زیستی $A\beta$ در مغز، با کاهش خطر اختلال ادراکی و شیوع زوال عقلی همراه است [۱۰]. به‌طور کلی، نتایج مطالعات ورزشی در مورد تعادل $A\beta$ مغزی، که نقش محوری در توسعه بیماری آزاریم دارد، به دلیل تنوع یافته‌ها چالش برانگیز بوده است. به‌طوری که کاهش [۱۱] و عدم تغییر [۱۲] سطوح $A\beta$ مغزی به دنبال تمرين جسمانی گزارش شده است. همچنین، یافته‌های متناقضی نیز در مورد عوامل درگیر در پاکسازی $A\beta$ مغزی به دنبال تمرين ورزشی به چشم می‌خورد [۱۳، ۱۴]. به علاوه، تاکنون مطالعه‌ای در مورد تأثیر تمرين ورزشی بر سطوح انتقال دهنده‌های $A\beta$ پلاسمایی، یعنی sLRP و ارتباط آن با $A\beta$ مغزی گزارش نشده است. بنابراین، با توجه به آثار مثبت متعددی که ورزش می‌تواند بر پیشگیری و حتی درمان این بیماری داشته باشد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرين هوایی تناوبی با شدت متوسط بر پروتئین مرتبط با گیرنده لیپوپروتئینی-۱ (LRP1)^۱ پلاسمایی و سطوح آمیلوئید بتای مغزی در رت‌های آزاریمی است.

روش بررسی

این تحقیق به روش تجربی و به صورت طرح تحقیقی پیش‌آزمون - پس‌آزمون اجرا گردید و اثر پاسخ سنجیده شد. آزمودنی‌های این مطالعه را تعداد ۳۰ سر رت ۸ هفته‌ای با میانگین وزن 191 ± 10 گرم تهیه شده از انستیتو پاستور ایران تشکیل دادند. بعد از یک هفته آشناسازی با محیط نگهداری، تمامی رت‌ها به مدت یک هفته (۱۰ دقیقه با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه و پنج روز در هفته) به منظور آشناسازی، در معرض نوارگردان قرار گرفتند. سپس، رت‌ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی ده‌تایی شامل گروه $A\beta$ +ورزش، گروه $A\beta$ و

². Aggregate

³. Stereotactic surgery/stereotaxy

1. low-density Lipoprotein Receptor related Protein



شکل ۱- پروتکل تمرین هوایی

پلاسمایی با استفاده از کیت‌های تجاری (شرکت کازابیو^۱ ساخت کشور چین) و روش الایزا (مدل بیوتک^۲ ساخت کشور امریکا) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار داده‌ها و از آمار استنباطی برای مقایسه گروه‌ها با هم استفاده شد. نرمال بودن توزیع داده‌های پیش‌آزمون با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش علاوه بر آمار توصیفی، برای بررسی نتایج بین گروهی از آزمون‌های تحلیل واریانس یکراهه با آزمودن تعقیبی LSD استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS نگارش ۲۶ انجام گرفت. از برنامه اکسل ۲۰۱۶ برای رسم نمودار استفاده گردید.

یافته‌ها

نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن داده‌ها را در متغیرهای مقادیر LRP-1، سطوح A β هیپوکمپ و پلاسما نشان داد. همچنین همگنی واریانس‌ها توسط آزمون لوین در تمامی گروه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس یک‌طرفه و در صورت معنی‌داری از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین سه گروه A β -ورزش، A β -کنترل، در متغیرهای A β هیپوکمپ،

وقفه ۵ دقیقه‌ای (استراحت غیرفعال، به منظور جلوگیری از خستگی عضلانی) روی نوارگردان دویدند. در هفته سوم با افزایش شدت و زمان فعالیت، رت‌ها با سرعت ۱۵ متر بر دقیقه در سه سمت جداگانه ۱۵ دقیقه‌ای با وقفه ۵ دقیقه‌ای بین سه سمت دویدند. در هفته چهارم، رت‌ها با سرعت ۱۵ متر بر دقیقه در چهار سمت جداگانه ۱۵ دقیقه‌ای با وقفه ۵ دقیقه‌ای بین سه سمت به فعالیت پرداختند [۱۶، ۱۷]. رت‌های گروه تمرین هوایی در طول مدت جلسات تمرینی پایش شدند و با استفاده از یک شوک الکتریکی ضعیف (شدت ۰/۵ میلی‌آمپر) که در حیوان ایجاد استرس زیادی نمی‌کند و یا دست‌کاری با یک اسفنج تشویق به ادامه دویدن شدند.

در پایان دوره تمرینی، ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، رت‌ها با تزریق مخلوط کتابین و زایلازین بی‌هوش شدند. سپس، سینه حیوان شکافته شده و پس از آشکار شدن قلب، خون‌گیری به طور مستقیم از بطن چپ صورت پذیرفت. نمونه‌های خونی پس از سانتریفوژ و به دست آوردن پلاسما در دمای ۲۰-درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. همچنین، سر حیوان جدا شد و مغز آن به صورت سالم بیرون آورده شد. پس از آن، هیپوکمپ راست به منظور اندازه‌گیری سطوح آمیلوئیدباتی مغزی استخراج شد. بافت هیپوکمپ هموژنیزه شد و بخش محلول آن جدا گردید و در دمای ۲۰-درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. اندازه‌گیری میزان LRP1 پلاسما، سطوح A β 1-42 و سطوح A β 1-44 مغزی و سطوح

جدول ۲- نتایج آزمون تعقیبی LSD بین گروههای مختلف در متغیرهای مورد مطالعه						
متغیر	اختلاف			مقایسه گروهها	مقدار p	
	خطای استاندارد	میانگین	با یکدیگر			
* $/0.01$	0.038	0.198	A β تزریق	A β هیپوکمپ ^a	0.001	
* $/0.01$	0.038	0.276	کنترل	A β تزریق+A β +ورزش	0.001	
* $/0.01$	0.038	0.274	کنترل	A β تزریق	0.001	
* $/0.01$	0.041	0.146	A β تزریق	A β پلاسما ^b	0.001	
* $/0.01$	0.041	0.199	کنترل	A β تزریق+A β +ورزش	0.001	
$/0.02$	0.041	0.053	کنترل	A β تزریق	0.001	
* $/0.01$	0.0514	0.2116	A β تزریق	A β LRP-1 ^c	0.001	
* $/0.01$	0.0514	0.2301	کنترل	A β تزریق+A β +ورزش	0.001	
* $/0.026$	0.0514	0.185	کنترل	A β تزریق	0.001	

^a: پیکولول بر میلی گرم بافت؛ ^b: پیکولول بر میلی لیتر پلاسما؛ ^c: میکروگرم بر میلی لیتر پلاسما

* وجود اختلاف معنی دار در سطح 0.05

دهه ها قبل از تشخیص بالینی آغاز می شود. در واقع، در تصویربرداری رادیولوژی نشان داده شده است که تجمع A β بیست سال قبل یا بیشتر از اولین علائم بالینی بیماری آلزایمر شروع می شود [۱۸]. گزارش شده است که تجمع A β با اختلال در عملکرد سیناپسی [۱۹]. کاهش رشد نورونیت [۲۰]، آتروفی مغزی و کاهش عملکرد شناختی همراه است [۲۱].

همسو با نتایج تحقیق حاضر یعقوبی و همکاران (۱۳۹۴) نشان دادند که سطوح A β ۱-۴۲ هیپوکمپ موش های آلزایمری گروه کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معنی داری بالاتر بود و در موش های گروههای تمرين آلزایمری با دو شدت پایین و بالا نسبت به گروه کنترل آلزایمر به طور معنی داری پایین تر بود [۲۲]. همچنین ادلارد و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند پنج ماه دویden اختیاری روی چرخ دور منجر به کاهش معنی داری در پلاک های خارج سلولی A β در قشر قدامی (٪۳۸) و قشر واقع در سطح هیپوکمپ (٪۵۳) و هیپوکمپ (٪۴۰) شد [۱۱]. چو و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که ۱۶ هفته دویden روی نوار گردان، سطوح A β ۱-۴۲ را در موش های ۱۳ ماهه آلزایمری کاهش داد [۲۳]. تزو-وی و همکاران^۱ (۲۰۱۵) گزارش کردند که ۱۰ هفته تمرين ترمیل A β در موش های ترنسزئیک APPswe/PS1dE9، سطوح A β محلول را هیپوکمپ و آمیگدال کاهش می دهد [۱۳].

فلاح محمدی و همکاران (۱۳۹۳) نشان داد که ۶ هفته تمرين

A β پلاسما و LRP1 محلول پلاسمای اختلاف معنی داری بود (جدول ۱).

نتایج آزمون تعقیبی LSD در متغیر A β هیپوکمپ نشان داد که بین گروههای تزریق+A β +ورزش و تزریق A β (p= 0.001)، تزریق A β +ورزش و کنترل (p= 0.001) و تزریق A β و کنترل (p= 0.001) در مقایسه دو گروه با هم اختلاف معنی دار بود. در متغیر A β پلاسما نشان داد که بین گروههای تزریق+A β +ورزش و تزریق A β (p= 0.001)، تزریق A β +ورزش و کنترل (p= 0.001) در مقایسه دو گروه با هم اختلاف معنی دار بود؛ اما بین گروههای تزریق A β و کنترل (p= 0.020) اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. همچنین در متغیر LRP1 محلول پلاسمای نشان داد که بین گروههای تزریق A β +ورزش و تزریق A β (p= 0.001)، تزریق A β +ورزش و کنترل (p= 0.001) و تزریق A β و کنترل (p= 0.026) در مقایسه دو گروه با هم اختلاف معنی دار بود (جدول ۲).

بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر نخستین مطالعه در خصوص بررسی اثر یک دوره تمرين تناوبی با شدت متوسط بر LRP1 محلول پلاسمایی و سطوح آمیلوئید بتای مغزی و پلاسمایی در رت های آلزایمری القا شده بود. آلزایمر با استرس اکسیداتیو و التهاب شناخته می شوند و اعتقاد بر این است که متابولیسم غیر طبیعی A β ، منجر به سطوح بالای الیگومرهای سمی A β همراه با استرس اکسیداتیو و التهاب، یک چرخه بیماریزا برای آلزایمر را تشکیل می دهد. در حالی که مرحله آغازین این تخریب عصبی هنوز مشخص نشده است، تصور می شود که این تغییرات

جدول ۱- سطوح متغیرهای وابسته در گروههای مورد مطالعه همراه با نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه

متغیر	گروه			مقدار p
	کنترل	A β	A β + ورزش	
* $/0.001$	A β هیپوکمپ ^a	0.079	0.071	0.001
* $/0.001$	A β پلاسما ^b	0.099	0.071	0.001
* $/0.001$	LRP-1 ^c	0.071	0.052	0.001

^a: پیکولول بر میلی گرم بافت؛ ^b: پیکولول بر میلی لیتر پلاسما؛ ^c: میکروگرم بر میلی لیتر پلاسما

* وجود اختلاف معنی دار در سطح 0.05

1. Tzu-Wei et al.

می‌توان گفت که افزایش سطوح $A\beta 1-42$ پلاسمایی احتمالاً ناشی از کاهش تجمع و افزایش پاکسازی این پروتئین در مغز باشد. این توضیح می‌تواند نتیجه مشاهده شده در مطالعه حاضر را منبی بر بالا بودن سطوح $A\beta 1-42$ پلاسمایی در گروه تزریق $A\beta$ و گروه تزریق $A\beta +$ ورزش توجیه نماید. بدین مفهوم که احتمالاً افزایش جبرانی پاکسازی از مغز در گروه تزریق $A\beta$ و افزایش پاکسازی ناشی از ورزش از مغز در گروه تزریق $A\beta +$ ورزش موجب بالا بودن سطوح $A\beta$ پلاسمایی نسبت به گروه کنترل شده است. یکی دیگر از سازوکارهای بالقوه افزایش سطوح $A\beta$ مغزی به دنبال تمرین ورزشی، افزایش سطوح LRP1 در سد خونی-مغزی و همچنین، افزایش سطوح LRP1 محلول پلاسمایی است که پاکسازی و آن از مغز را تسهیل می‌کند [۱۴].

مطالعات مختلف سازوکارهای متفاوتی را برای کاهش سطوح $A\beta$ مغزی به دنبال تمرین ورزشی پیشنهاد نموده‌اند. ادلارد و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند که تمرین اختیاری ممکن است متابولیسم پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید و آبشار $A\beta$ را در راستای کاهش تولید $A\beta$ میانجی‌گری کند. سازوکار احتمالی دیگری در رابطه با ورزش و سطوح $A\beta$ عبارت از این است که تنظیم مثبت فعالیت پروتئازوم ناشی از ورزش است که می‌تواند تخریب قطعات پروتولیتیکی پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید (که در تولید $A\beta$ نقش مهمی دارد) را میانجی‌گری نماید [۹]. چو و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که فعالیت ورزشی، احتمالاً از طریق تنظیم فرآیند پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید یا افزایش تخریب و پاکسازی $A\beta$ می‌تواند مقادیر پلاک‌های $A\beta$ مغز را کاهش دهد [۲۳]. یکی دیگر از سازوکارهای بالقوه کاهش سطوح $A\beta$ مغزی به دنبال تمرین ورزشی، افزایش سطوح LRP1 در سد خونی-مغزی و همچنین، افزایش LRP1 محلول پلاسمایی است که پاکسازی و آن از مغز را تسهیل می‌کند [۱۴]. در مطالعه حاضر، سطوح LRP1 در سد خونی-مغزی اندازه‌گیری نشد، اما افزایش LRP1 محلول پلاسمایی به دنبال تمرین ورزشی نشان داده شد.

دویدن اختیاری روی چرخ دوار موجب کاهش سطوح آمیلوئید بتای قشر مغز در موش‌های صحرایی دیابتی تحریک شده با آلوکسان می‌شود [۲۴]. با این حال، جانکوفسکی و همکاران^۱ (۲۰۰۳) گزارش کردند که موش‌های ترسنسرنیک APPswe/PS1dE9 که در معرض ۶/۵ ماه غنی‌سازی محیطی قرار گرفته‌اند، بار آمیلوئیدی بالاتر همراه با افزایش در تجمع $A\beta$ و $A\beta$ تام را نشان می‌دهند [۲۵]. همراستا با نتایج پژوهش حاضر در بخش A β پلاسما فلاخ‌محمدی و همکاران [۲۲] در تحقیق خود به بررسی تأثیر ترکیبی تمرین اختیاری و مصرف عصاره آلیوم پارادوکسوم بر سطوح $A\beta 1-42$ پلاسمایی موش‌های صحرایی دیابتی پرداخته و نشان دادند که میزان $A\beta 1-42$ پلاسمایی گروه ورزشی نسبت به گروه کنترل به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. در سد خونی-مغزی، پروتئین‌ها و پیتیدها می‌توانند از طریق سیستم‌های انتقال (حامل‌های ویژه یا گیرنده‌ها) در هر دو جهت عبور کنند. پروتئین $A\beta$ نیز به‌طور فعال از خون به سمت مغز توسط گیرنده فرآورده نهایی گلایکوسایون پیش‌رفته^۲ و از مغز به سمت خون توسط پروتئین مرتبط با گیرنده لیپوپروتئینی-۱^۳ (LRP1) و نیز گلیکوپروتئین-P^۴ منتقل می‌شود. اما در سد خونی-مغزی بیماران مبتلا به آلزایمر، تنظیم مثبت و LRP1 و P-gp تنظیم منفی می‌شوند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش پاکسازی و انتقال به خارج از مغز $A\beta$ و افزایش انتقال آن به درون مغز شود که در نتیجه افزایش بیشتر رسوب $A\beta$ را در مغز و کاهش آن در پلاسما را در پی خواهد داشت [۲۶]. با توجه به این سازوکار به نظر می‌رسد که فعالیت ورزشی ممکن است این الگو را در سد خونی-مغزی معکوس نموده که در نتیجه منجر به افزایش پاکسازی $A\beta$ از مغز به سمت خون و کاهش انتشار این پروتئین از خون به سمت مغز شود [۱۳، ۹]. بنابراین،

1. Jankowsky et al.

2. Receptor for -RAGE Advanced Glycation End-Products

3. low-density Lipoprotein Receptor related Protein

4. P-glycoprotein-P-gp

حذف نهایی می‌رود [۲۸].

به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که القای بیماری آلزایمر موجب افزایش سطوح $A\beta$ در مغز و پلاسمای می‌شود. همچنین، سطوح LRP1 محلول پلاسمایی نیز افزایش جبرانی می‌یابد. با این حال، تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط می‌تواند با افزایش سطوح LRP1 محلول پلاسمایی و پاکسازی محیطی سطوح $A\beta$ در هیپوکمپ، منجر به تعدیل و کنترل عوامل مؤثر در بیماری آلزایمر در رت‌های آزمایشگاهی داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر یک راهبرد ساده برای مقاومت در مقابل توسعه نوروپاتولوژی بیماری آلزایمر در مغز را تقویت نماید.

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر با شناسه اخلاق IR.IAU.PS.REC.1399.170 در دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی مصوب و مورد تأیید قرار گرفت.

تعارض در منافع

بین نویسندها هیچ‌گونه تعارضی در منافع انتشار این مقاله وجود ندارد.

مطالعه حاضر نشان داد که سطوح LRP1 محلول پلاسمایی در گروه تزریق $A\beta$ ۱-۴۲ افزایش یافت. این افزایش احتمالاً مربوط به افزایش جبرانی برای پاکسازی بیشتر $A\beta$ بوده است. از سوی دیگر، گروه تزریق $A\beta$ + ورزش به طور قابل توجهی سطوح LRP1 محلول پلاسمایی را افزایش دادند که احتمالاً به دلیل آثار سودمند ورزش بر این فاکتور است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سطوح LRP1 محلول در بیماران مبتلا به آلزایمر در مقایسه با افراد سالم کمتر است [۲۷]. افزایش سطوح LRP1 محلول پلاسمایی در خون حیوانات آلزایمری احتمالاً به دلیل افزایش جبرانی این فاکتور LRP1 برای پاکسازی $A\beta$ است [۱۴]. افزایش سطوح LRP1 می‌تواند ناشی از یک مکانیسم بازخورد باشد که منجر به افزایش سطح LRP1 بعد از ورزش به منظور از بین بردن $A\beta$ از مغز می‌شود. همسو با نتایج پژوهش حاضر لین و همکاران (۲۰۱۵) نشان دادند که ورزش روی تردیل بیان LRP1 را در هیپوکمپ افزایش می‌دهد [۱۳]. همچنین در پژوهشی دیگر مور و همکاران (۲۰۱۶) نیز افزایش LRP1 پلاسمایی در رت‌های آلزایمری را گزارش کردند و نشان می‌دهد که جریان $A\beta$ توسط LRP1 همراه با افزایش تخریب پروتئولیتیک $A\beta$ به ترخیص $A\beta$ از مغز کمک می‌کند. به دنبال حمل $A\beta$ مغز به خون (تقریباً نیمی از کل $A\beta$ مشتق از CNS)، $A\beta$ متصل به LRP1 در خون آزاد و به سمت کبد و احتمالاً کلیه‌ها برای

References

1. Barnes DE, Yaffe K. The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer's disease prevalence. *The lancet neurology*. 2011; 10(9):819-828. doi:[10.1016/S1474-4422\(11\)70072-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(11)70072-2)
2. Villeda SA, Luo J, Mosher KI, Zou B, Britschgi M, Bieri G, et al. The ageing systemic milieu negatively regulates neurogenesis and cognitive function. *Nature*. 2011; 477(7362):90-94. doi:[10.1038/nature10357](https://doi.org/10.1038/nature10357)
3. Kawas CH, Brookmeyer R. Aging and the public health effects of dementia. *The New England Journal of Medicine*. 2001; 344(15):1160-1161. doi:[10.1056/NEJM200104123441509](https://doi.org/10.1056/NEJM200104123441509)
4. Mangialasche F, Solomon A, Winblad B, Mecocci P, Kivipelto M. Alzheimer's disease: clinical trials and drug development. *The lancet neurology*. 2010; 9(7):702-716. doi:[10.1016/s1474-4422\(10\)70119-8](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(10)70119-8)
5. Ahlskog JE, Geda YE, Graff-Radford NR, Petersen RC. Physical exercise as a preventive or disease-modifying treatment of dementia and brain aging. *Mayo Clinic proceedings*. 2011; 86(9):876-884. doi:[10.4065/mcp.2011.0252](https://doi.org/10.4065/mcp.2011.0252)
6. Nath S, Agholme L, Kurudenkandy FR, Granseth B, Marcusson J, Hallbeck M. Spreading of neurodegenerative pathology via neuron-to-neuron transmission of β -amyloid. *The Journal of neuroscience*. 2012; 32(26):8767-8777. doi:[10.1523/JNEUROSCI.0615-12.2012](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0615-12.2012)

7. Agholme L, Hallbeck M, Benedikz E, Marcusson J, Kågedal K. Amyloid- β secretion, generation, and lysosomal sequestration in response to proteasome inhibition: involvement of autophagy. *Journal of Alzheimer's disease*. 2012; 31(2):343-358. doi:[10.3233/JAD-2012-120001](https://doi.org/10.3233/JAD-2012-120001)
8. Bates KA, Verdile G, Li QX, Ames D, Hudson P, Masters CL, et al. Clearance mechanisms of Alzheimer's amyloid-beta peptide: implications for therapeutic design and diagnostic tests. *Molecular psychiatry*. 2009; 14(5):469-486. doi:[10.1038/mp.2008.96](https://doi.org/10.1038/mp.2008.96)
9. Adlard PA, James SA, Bush AI, Masters CL. beta-Amyloid as a molecular therapeutic target in Alzheimer's disease. *Drugs of today*. 2009; 45(4):293-304. doi:[10.1358/dot.2009.45.4.1353853](https://doi.org/10.1358/dot.2009.45.4.1353853)
10. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2011; 108(7):3017-3022. doi:[10.1073/pnas.1015950108](https://doi.org/10.1073/pnas.1015950108)
11. Adlard PA, Perreau VM, Pop V, Cotman CW. Voluntary exercise decreases amyloid load in a transgenic model of Alzheimer's disease. *The journal of neuroscience*. 2005; 25(17):4217-4221. doi:[10.1523/JNEUROSCI.0496-05.2005](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0496-05.2005)
12. Arendash GW, Garcia MF, Costa DA, Cracchiolo JR, Wefes IM, Potter H. Environmental enrichment improves cognition in aged Alzheimer's transgenic mice despite stable beta-amyloid deposition. *NeuroReport*. 2004; 15(11):1751-1754. doi:[10.1097/01.wnr.0000137183.688474.4e](https://doi.org/10.1097/01.wnr.0000137183.688474.4e)
13. Lin TW, Shih YH, Chen SJ, Lien CH, Chang CY, Huang TY, et al. Running exercise delays neurodegeneration in amygdala and hippocampus of Alzheimer's disease (APP/PS1) transgenic mice. *Neurobiology of learning and memory*. 2015; 118:189-197. doi:[10.1016/j.nlm.2014.12.005](https://doi.org/10.1016/j.nlm.2014.12.005)
14. Herring A, Yasin H, Ambrée O, Sachser N, Paulus W, Keyvani K. Environmental enrichment counteracts Alzheimer's neurovascular dysfunction in TgCRND8 mice. *Brain pathology*. 2008; 18(1):32-39. doi:[10.1111/j.1750-3639.2007.00094.x](https://doi.org/10.1111/j.1750-3639.2007.00094.x)
15. Prakash A, Medhi B, Chopra K. Granulocyte colony stimulating factor (GCSF) improves memory and neurobehavior in an amyloid- β induced experimental model of Alzheimer's disease. *Pharmacology, biochemistry, and behavior*. 2013; 110:46-57. doi:[10.1016/j.pbb.2013.05.015](https://doi.org/10.1016/j.pbb.2013.05.015)
16. Zagaar M, Alhaider I, Dao A, Levine A, Alkarawi A, Alzubaidy M, et al. The beneficial effects of regular exercise on cognition in REM sleep deprivation: behavioral, electrophysiological and molecular evidence. *Neurobiology of disease*. 2012; 45(3):1153-1162. doi:[10.1016/j.nbd.2011.12.039](https://doi.org/10.1016/j.nbd.2011.12.039)
17. Dao AT, Zagaar MA, Alkadhi KA. Moderate Treadmill Exercise Protects Synaptic Plasticity of the Dentate Gyrus and Related Signaling Cascade in a Rat Model of Alzheimer's Disease. *Molecular neurobiology*. 2015;52(3):1067-1076. doi:[10.1007/s12035-014-8916-1](https://doi.org/10.1007/s12035-014-8916-1)
18. Villemagne VL, Rowe CC. Long night's journey into the day: amyloid- β imaging in Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's disease : JAD*. 2013;33 Suppl 1:S349-359. doi:[10.3233/jad-2012-129034](https://doi.org/10.3233/jad-2012-129034)
19. Haass C, Selkoe DJ. Soluble protein oligomers in neurodegeneration: lessons from the Alzheimer's amyloid beta-peptide. *Nature reviews. Molecular cell biology*. 2007;8(2):101-112. doi:[10.1038/nrm2101](https://doi.org/10.1038/nrm2101)
20. Manczak M, Mao P, Calkins MJ, Cornea A, Reddy AP, Murphy MP, et al. Mitochondria-targeted antioxidants protect against amyloid-beta toxicity in Alzheimer's disease neurons. *Journal of Alzheimer's disease : JAD*. 2010;20 Suppl 2(Suppl 2):S609-631. doi:[10.3233/jad-2010-100564](https://doi.org/10.3233/jad-2010-100564)
21. Cash DM, Ridgway GR, Liang Y, Ryan NS, Kinnunen KM, Yeatman T, et al. The pattern of atrophy in familial Alzheimer disease: volumetric MRI results from the DIAN study. *Neurology*. 2013;81(16):1425-1433. doi:[10.1212/WNL.0b013e3182a841c6](https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3182a841c6)
22. Yaghoubi A, Saghebjoo M, Fallah Mohammadi Z, Hedayati M, Hajizadeh Moghaddam A. Effects of continuous training intensity on amyloid beta1-42($\text{a}\beta$ 1-42) levels in hippocampus of homocysteine-induced alzheimer's model rats. *Journal of Arak University of Medical Sciences*. 2016;18(11):83-93.
23. Cho JY, Um HS, Kang EB, Cho IH, Kim CH, Cho JS, et al. The combination of exercise training and alpha-lipoic acid treatment has therapeutic effects on the pathogenic phenotypes of Alzheimer's disease in NSE/APPsw-transgenic mice. *International journal of molecular medicine*. 2010;25(3):337-346. doi:[10.3892/ijmm_00000350](https://doi.org/10.3892/ijmm_00000350)
24. Falah mohammadi Z, Ebrahimzadeh M. The effect of allium paradoxum extract combined with voluntary wheel running on brain amyloid beta ($\text{a}\beta$ 1-42) levels in diabetic male rats. *Journal of Sport Biosciences*. 2013;1(16):21-34. [Persian]. doi:[10.22059/jsb.2013.30455](https://doi.org/10.22059/jsb.2013.30455)
25. Jankowsky JL, Xu G, Fromholt D, Gonzales V, Borchelt DR. Environmental enrichment exacerbates amyloid plaque formation in a transgenic mouse model of Alzheimer disease. *Journal of neuropathology and experimental neurology*. 2003;62(12):1220-1227. doi:[10.1093/jnen/62.12.1220](https://doi.org/10.1093/jnen/62.12.1220)
26. Jolivalt CG, Hurford R, Lee CA, Dumaop W, Rockenstein E, Masliah E. Type 1 diabetes exaggerates features of Alzheimer's disease in APP transgenic mice. *Experimental neurology*. 2010;223(2):422-431. doi:[10.1016/j.expneurol.2009.11.005](https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2009.11.005)
27. Sagare A, Deane R, Bell RD, Johnson B, Hamm K, Pendu R, et al. Clearance of amyloid-beta by circulating lipoprotein receptors. *Nature medicine*. 2007;13(9):1029-1031. doi:[10.1038/nm1635](https://doi.org/10.1038/nm1635)
28. Moore KM, Girens RE, Larson SK, Jones MR, Restivo JL, Holtzman DM, et al. A spectrum of exercise training reduces soluble $\text{A}\beta$ in a dose-dependent manner in a mouse model of Alzheimer's disease. *Neurobiology of disease*. 2016;85:218-224. doi:[10.1016/j.nbd.2015.11.004](https://doi.org/10.1016/j.nbd.2015.11.004)

The effect of a moderate-intensity interval training on the plasma levels of LDL receptor-related protein-1 (LRP1) and cerebral and plasma levels of amyloid beta in induced Alzheimer's rats

Mostafa Zarin Afzal¹, Yaser Kazemzadeh^{2✉}, Saeed Sedaghati²,
Sanaz Mirzayan³, Abdolali Banaeifar⁴

Abstract

Background: Deposition of amyloid beta ($A\beta$) in the brain triggers Alzheimer's disease. The aim of the present study was to investigate the effect of moderate-intensity interval training the plasma levels of LDL receptor-related protein-1 (LRP1) and cerebral and plasma levels of amyloid beta in induced Alzheimer's rats.

Materials and methods: For this purpose, 30 eight-week-old Wistar rats with an average weight of 191 ± 10 g were randomly divided into three equal groups: $A\beta$ +exercise, $A\beta$, and the control group. The rats of the first and second groups became Alzheimer's by injecting $A\beta1-42$ into the intraventricular space. After three days of recovery, the $A\beta$ +exercise group experienced moderate-intensity intermittent aerobic exercise for four weeks. The other groups continued their normal lives.

Results: The results of one-way analysis of variance showed that there was a significant difference between the average levels of hippocampal $A\beta$, plasma $A\beta$, and plasma LRP1 in different groups ($p=0.001$). Also, the results of LSD post hoc test showed the greatest difference between the mean of $A\beta$ +exercise group and $A\beta$ group in the above variables.

Conclusion: In summary, the results of the present study indicated that the moderate-intensity interval training can increase the plasma levels of LRP1 and environmental clearance of $A\beta$ levels in the hippocampus, resulting in the modulation and control of factors affecting Alzheimer's disease in laboratory rats.

Keywords: Aerobic Exercise, Alzheimer's Disease, beta Amyloid, LRP1 protein/human

1. PhD student of exercise physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

2. Assistant professor, Department of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (✉Corresponding author)
yaser.kazemzadeh@yahoo.com

3. Associate professor, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4. Associate professor, Azad University, Tehran Jonoub Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran